

验案二则

开滦总医院中医科 刘淑珍

一、中药治愈小儿痉挛症一例

刘某，男，四个月。

患儿无明显诱因，十二小时以来抽搐发作三、四次，每次约五分钟，抽时两眼上吊或直视，两手握拳，四肢强直，无大小便失禁，而医以手足抽搐症收住院。补10%葡萄糖酸钙10毫升，仍抽搐不止，性质时间同前。患儿发病以来无发热、吐泻、咳喘及外伤史。精神饮食正常，足月顺产，父母健康。父母亦非近亲结婚，查体无阳性发现，克氏征阴性，布氏征阴性，化验血象正常，血钙11毫克%，脑电图正常。给予鲁米那、ACTH肌注、口服钙素母等，患儿在睡眠时不抽，醒后又抽，住院四天，经儿科主任医师确诊为小儿痉挛症。患儿出院后用以上药物病情始终不能控制，6月6日来中医诊治。

中医四诊所见：患儿抽搐频频发作，两眼上吊，四肢抽动时强直，发作后精神不振，睡眠易惊，二便正常，脉滑，舌淡红，白苔，近两日有外感风寒史。

综上脉症，诊为小儿惊风，多由风痰所致，治以柔肝熄风定惊化痰。

处方：僵蚕3克 双钩6克 芥穗3克 羌活3克 菖蒲3克 首乌藤10克 白芍6克 生地6克 牡蛎10克 竹茹3克 地龙3克 甘草3克，水煎服，日一剂分三次服。患儿服上方13剂，抽搐半月未作，至6月30日，抽搐发作一次，患儿目赤，便干难解，恐痰热又盛，以致惊风发作，易清热化痰止惊法。

处方：僵蚕3克 双钩5克 竺黄3克 茯神6克 菖蒲3克 丹参6克 首乌藤10克 连翘10克 柏仁5克 黄芩3克 竹茹3克。

上药间断服用十余剂，抽搐未作，至8月14日，身出水痘又致惊风发作，仍用上方加减服药9剂，水痘愈，惊风止，自前年8月22日至今，随访二年余，发育良好，智力正常，说话走路皆与同龄儿无异，抽搐始终未作，否定了儿科认为痉挛症只能日见加重后致报残的预见。

二、瘀血致渴案

孙某女 52岁 干部 病历号23064

患者因头痛，口干渴不能忍耐，时时漱水于8年2月12日来中医就诊。患者一年前头部受外伤，随之出现口干渴，常自行吃藕一顿可达三斤余，但仍不能止渴，月经绝经三年，舌质紫暗，脉缓无力，大便正常或偶有发干，小便正常，全身检查无其它阳性发现，拟滋阴健脾生津法治疗服药5剂，症稍见好转，两个月后又出现口干渴漱水，全身乏力，头痛头晕，舌紫暗脉缓，治疗根据患者头痛有外伤史，舌质紫暗，口渴证用滋阴健脾生津法未见明显疗效，可能与瘀血阻络，气血津气运化失常有关，易活血化痰通窍法治疗。

处方：丹参30克 红花10克 郁金15克 莪术10克 土元10克 牛夕10克 寄奴10克 桑椹15克 花粉15克 黄精15克 云苓15克 石斛12克。

上方连续服用20余剂，头痛渐愈，口渴亦止，舌质转为淡红。

瘰疬治验

赵家成

瘰疬俗称粉刺，是青春期男女的常见病，多发病。它不仅损伤面部肌肤，而且影响美容，造成许多青年男女的心理障碍。因此应该给予高度重视。笔者用中药治疗收到较好疗效。

例一：李某，女，17岁，高三学生。

初诊：颜面布满脓疱样瘰疬，大者如赤豆，小者如粟米，痛痒时作，抓破后流脓或血水样液体。时有心烦、口苦，大便三日一次，小便色黄，至月经来潮前后发作尤甚。舌质红，脉数，面部油垢。

辨证：此为热毒血瘀所致。

治法：解毒化痰通络。

药物：野菊20g 双花20g 连翘20g 地丁20g 当归10g 赤芍10g 丹皮10g 桃仁10g 紫草10g 元参20g 丝瓜络15g 天花粉15g 荆芥6g。

二诊：经服上药四剂，脓疱消肿并结痂，大便一日一次，小便淡黄，无心烦口苦。见其效果显著，继用前方四剂，诸证皆愈，痂退面部无一疤痕。嘱其经常保持面部卫生，忌辛辣刺激性食物，