

臌胀治验一例

中医学院第一附属医院 内科刘德清

李××，男，24岁，住本市西郊区大寺公社李庄子大队，1979年9月19日初诊。

罹臌胀一月余，面色苍黄不华，形体瘦弱，腹大如鼓，腹壁青筋暴露，腹胀难忍，食少无力，大便溏泻，尿少而黄，兼有鼻衄，齿衄，舌质暗淡滑白苔，脉沉弦而虚。

查：腹水证(+)，腹围85cm，肝未扪及，脾在左肋下2.5cm；肝功能：射浊18单位，白蛋白1.75克%，球蛋白4.00克%，谷丙转氨酶88单位，HBSAg(-)，非蛋白氮31mg%，二氧化碳结合力44.3ml%，PSP试验0%。血小板34000/mm³。

辨证：素有肝病，迁延失治，而成臌胀重症。系肝脉瘀痹，气色贯流受阻，肝失所养，脾土虚弱，营卫精微不充，土不制水，所幸肾气尚未戕伤，生机犹存。

治疗：益气健脾以促助精微之生化，

... ..

冠心病中出现心律失常，特别是心肌梗塞并发心律失常多属病情较重，本病临床主要表现心悸，心主血脉，即心有推动血液运行于脉中的作用，血之运行需以心气、心阳为动力，若心气充足，则血在脉中循环不息，当久病而引起心气不足，心阳衰微，则无力推动血液运行，使血流迟缓，血脉凝滞，故脉多见迟脉。脉之运行亦需心血营养及心阴的滋润，心阴不足，血少，亦使血脉不能接续，所以因气虚、血少，最终必导致血脉瘀阻，故脉多见促、涩、结脉，总之本病多为虚中挟实证，证状为心悸，病位在心，病机为心阳衰微或气阴两虚血脉瘀阻，治疗在于温阳

活血化痰以畅通肝脉之循环。以补为通，望腹水渐消为幸。

处方：(一)红人参、茵陈、猪苓、厚朴、车前草各15克、山药、黄精各20克，大肤皮12克，茯苓30克，泽泻24克，草果仁，乌药各10克。

浓煎二次取药300升，每日上午~中午分二次服。

(二)方：桃红，红花，赤芍，胡，枳壳，丹皮，陈皮各10克阿胶12克，川芎，香附各6克，当归，鳖甲各15克，丹参，黄芪各30克。

浓煎二次，取药300毫升，每日下午~晚间分二次温服。

嘱：适寒温以防时邪外感，忌盐碱，勿食油炸等硬物以防刺伤胃络出血；调营养以助精微化生。

效果：两方并进，兼饮食消息，治疗三月余，腹水尽消，精神食欲佳，面色红润，体力大复。复查血色素12.16克%，血小板9.1万，白蛋白3.18克%，球蛋白2.76克%，射浊16单位。曾追访半年病情稳定。

益气养阴活血。对于病程短，体质壮实，因情志因素而诱发心悸发作的可单纯表现为气滞血瘀型。

治疗用药人参能大补元气，益气生津、安神，无论是心阳虚型或气阴两虚型均为主要药物。现代药研认为人参对心肌和血管有直接作用，对心肌无力有一定改善作用，并有强心作用。对阳虚型配合附子、人参剂量为10—15克；对于气阴两虚型人参用量为15—30克，病情稳定后，可用党参代替之。桂枝辛温通阳，以推动血之运行，使血脉畅通。川芎、红花功能活血化痰，配合各型治疗均可起到活血脉畅的功效。